

EDITORIAL

De afgelopen jaren heeft de orale implantologie in Nederland een enorme vlucht genomen. Het aantal geplaatste implantaten en behandelde patiënten per jaar neemt nog steeds toe. De stijging van de kosten van de implantologie is voor veel zorgverzekeraars een punt van aandacht. Zorgverzekeraars proberen de totale kosten van de implantologie te verlagen door kritisch te kijken naar honoraria van tandartsen en de verschillende technieknota's van tandtechnische laboratoria. Veel collega's worden geconfronteerd met zorgverzekeraars die vaste contracten willen aanbieden teneinde de beheersbaarheid van de kosten van de implantologie te vergroten. Ook wordt er steeds vaker gediceerd door de zorgverzekeraar hoeveel, en soms ook welk type dan wel merk implantaten er wordt goedgekeurd. Vanuit deze groep collega's is ook duidelijk de vraag aan de NVOI gesteld om een richtlijn te geven ten aanzien van de indicatiestelling van implantaten in onder- en bovenkaak ten behoeve van een overkappingsprothese. De volgende richtlijn kan worden gebruikt in de communicatie met de zorgverzekeraar:

1. Edentate onderkaak

- a. Bij de behandeling van de edentate onderkaak met een minimale bothoogte van 12 mm in de intraforaminale regio is de plaatsing van 2 implantaten de standaard procedure. Tevens wordt ervan uit gegaan dat de implantaten als 1 fase procedure worden geplaatst. (Onafhankelijk van het gebruik van 1- dan wel 2-fase implantaatsysteem.) Ook de vervaardiging van een proefopstelling in deze situatie is niet langer geïndiceerd.
- b. Indicatie voor het plaatsen van 4 implantaten in de onderkaak:
 - kaakhoogtes van < 12 mm
 - aanwezigheid van een betande bovenkaak / overkappingsprothese in de bovenkaak
 - periostale prikkeling dan wel compressie n. Mentalis
 - aanwezigheid van een spitse onderkaak

2. Edentate bovenkaak

- Bij de plaatsing van implantaten in de maxilla, zeker bij een geaugmenteerde processus alveolaris superior, is de standaard nog altijd 6 implantaten. Toekomstig literatuuronderzoek zal mogelijk nog een differentiatie van dit aantal implantaten kunnen aanbrengen.
- Het aanbrengen van implantaten in de bovenkaak is geïndiceerd indien:
- a. er sprake is van persisterende retentie en stabiliteitklachten bij een ernstig geatrofiëerde maxilla ondanks de vervaardiging van een prothese welke aan de daarvoor geldende eisen voldoet
 - b. patiënt met hevige kokhalsreflex
 - c. patiënten met klachten van persisterende branderigheid van de mucosa